

【】 力

【】 力の単位

[問題]

れんがの質量が  $2\text{kg}$  であるとき、このれんがにはたらく地球の重力の大きさはおよそ何  $\text{N}$  か、最も適当なものを下から 1 つ選べ。

[ およそ  $2\text{N}$    およそ  $20\text{N}$    およそ  $200\text{N}$    およそ  $2000\text{N}$  ]

(三重県)

[解答欄]

[解答]およそ  $20\text{N}$

[解説]

地球上にある物体を地球が引く力を「重力」という。 $100\text{g}$ の物体に働く地球上の重力の大きさはおよそ  $1\text{N}$ (ニュートン)である。れんがの質量は  $2\text{kg}=2000\text{g}$ なので、このれんがにはたらく地球の重力の大きさは、 $2000 \div 100 = 20(\text{N})$ である。

[問題]

$300\text{g}$  のおもりをニュートン目盛りのばねばかり(ニュートンばかり)につるし、目盛りを読みとった。ニュートンばかりが示す値はおよそ何  $\text{N}$  か。

(鳥取県)

[解答欄]

[解答] $3\text{N}$

[問題]

次のア～エのうち、 $1\text{N}$  の力の大きさについて正しく述べているものはどれか。1 つ選び、その記号を書け。

ア  $1\text{g}$  の物体にはたらく地球の重力の大きさと、ほぼ等しい。

イ  $10\text{g}$  の物体にはたらく地球の重力の大きさと、ほぼ等しい。

ウ  $100\text{g}$  の物体にはたらく地球の重力の大きさと、ほぼ等しい。

エ  $1000\text{g}$  の物体にはたらく地球の重力の大きさと、ほぼ等しい。

(岩手県)

[解答欄]

[解答]ウ

[問題]

静電気の力や磁石の力は、物体どうしが離れていてもはたらく。この2つの力の他に、物体どうしが離れていてもはたらく力の名前を書け。

(福岡県)

[解答欄]

[解答]重力

[問題]

重力は、( ① )が物体を②(押す／引く)力である。

(香川県)

[解答欄]


①	②
---	---

[解答]① 地球 ② 引く


【】ばねの問題

[問題]

4つのばねAの上端を固定し、1つは何もつり下げず、他の3つには質量50gのおもりBをそれぞれ1個、2個、3個つり下げた。それぞれのばねAは、ある長さを保ったまま静止したので、図1のようにそれぞれの伸びを定規を用いて測定した。次に、図2のように、ばねAにおもりCを1個つり下げたところ、ばねAは10cmだけ伸びて静止した。



- (1) 図2で、おもりCにはたらく力を、図中に矢印でかき入れよ。ただし、おもりCにはたらく重力はすでに矢印で示している。
- (2) おもりCの質量は何gか。
- (3) 図3のように、質量150gで、一辺の長さが5cmの立方体Dを水平な板の上に置き、真上に手でゆっくり引いていったところ、立方体Dは板から離れた。立方体Dが板から離れたとき、ばねAの伸びは何cmか。



(佐賀県)

[解答欄]

<p>(1)</p>	
<p>(2)</p>	<p>(3)</p>


[解答](1) (2) 100g (3) 15cm




[解答欄]

(1)①

②




(2)①




②

[解答](1)① ばねがおもりをおす力 ②






(2)①



② 比例の関係

[問題]

図1のように、ばねにおもりをつり下げ、おもりの質量とばねの伸びとの関係を調べたところ、図2のようになった。このばねの一端に磁石Aを、また、棒の一端に磁石Bを取り付け、水平に置かれた摩擦のない板の上に置いた。図3のように磁石Bを磁石Aに近づけていき、ばねの伸びが0.5cmとなったところでとめた。磁石をとめたとき、磁石Bが磁石Aを引く力の大きさは何Nか。ただし、質量100gの物体にはたらく重力の大きさは1Nとする。



(茨城県)

[解答欄]

[解答]0.1N

[解説]

図2より、ばねののびが0.5cmになるのは10gのおもりをつり下げたときである。100gの質量の物体にはたらく重力の大きさが1Nなので、10gのおもりにはたらく重力の大きさは0.1Nである。したがって、このばねが0.5cmのびるのは0.1Nの力を加えたときである。


【】 圧力

【】 圧力

[圧力の計算]

[問題]

ばねと台を用いて、右図のように、手のひらでばねに力を加え、台が床を下向きにおす力の大きさを  $1.5\text{N}$  にした。このとき、台と床がふれ合う面にかかる圧力は何Pa(パスカル)か。なお、台と床がふれ合う面積は  $50\text{cm}^2$  で、 $1\text{Pa} = 1\text{N}/\text{m}^2$  であり、台と床は平らである。また、ばねと台の重さや大気圧は考えないものとする。



(山形県)

[解答欄]

[解答]  $300\text{Pa}$

[解説]


$1(\text{m}^2) = 100(\text{cm}) \times 100(\text{cm}) = 10000(\text{cm}^2)$  なので、 $50\text{cm}^2 = 50 \div 10000 = 0.005\text{m}^2$

また、台が床を下向きにおす力の大きさは  $1.5\text{N}$  なので、

(圧力) = (力)  $\div$  (面積) =  $1.5(\text{N}) \div 0.005(\text{m}^2) = 300(\text{N}/\text{m}^2) = 300(\text{Pa})$  となる。

[問題]

正方形板 A の一辺の長さを  $4\text{cm}$  としたとき、①質量  $600\text{g}$  のおもりをのせたときにスポンジが正方形板 A から受ける圧力の大きさは何パスカルか。②また、単位を記号で書け。ただし、 $100\text{g}$  のおもりにはたらく重力の大きさを  $1\text{N}$  として計算せよ。



(山梨県)


[解答欄]

①	②
---	---

[解答] ①  $3750$  パスカル ② Pa

[問題]

右図のように、水平な机の上に、縦 15cm、横 20cm、厚さ 3cm、質量 600gの板を置き、その上に水を入れて質量 500gにした容器をのせた。容器の底面積は 100cm<sup>2</sup>である。質量 100gの物体にはたらく重力の大きさを 1Nとして、次の問いに答えよ。



- (1) 容器が板の上面を押す圧力は、何N/m<sup>2</sup>か。
- (2) 容器に水を追加して、板が机の上面を押す圧力が 400N/m<sup>2</sup>になるようにしたい。容器に質量何gの水を追加すればよいか。

(徳島県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 500N/m<sup>2</sup> (2) 100g

[解説](1) 水を入れた容器の質量は 500gなので、これにはたらく重力の大きさは、 $500 \div 100 = 5$ (N)である。また、 $1(\text{m}^2) = 100(\text{cm}) \times 100(\text{cm}) = 10000(\text{cm}^2)$ なので、 $100(\text{cm}^2) = 100 \div 10000 = 0.01(\text{m}^2)$ である。したがって、(圧力)=(力) $\div$ (底面積) $= 5(\text{N}) \div 0.01(\text{m}^2) = 500(\text{N}/\text{m}^2)$ となる。

(2) 板が机と接している部分の面積は、 $0.2(\text{m}) \times 0.15(\text{m}) = 0.03(\text{m}^2)$ である。

容器に  $x$  g の水を追加すると、容器と水と板の質量の合計は、 $500 + x + 600 = x + 1100$ (g)となる。 $x + 1100$ (g)の物体にかかる重力の大きさは、 $(x + 1100) \div 100 = \frac{x + 1100}{100}$ (N)になる。


したがって、(板が机の上面を押す圧力) $= \frac{x + 1100}{100} \div 0.03 = \frac{x + 1100}{100} \times \frac{100}{3} = \frac{x + 1100}{3}$ と

なる。よって、 $\frac{x + 1100}{3} = 400$ ,  $x + 1100 = 400 \times 3$ ,  $x = 1200 - 1100 = 100$ (g)となる。



[問題]

図1のように、250gの直方体の物体がA面を上にして机の上に置いてある。①この物体にはたらく重力は何Nか、100gの物体にはたらく重力を1Nとして求めよ。②また、図2のようにB面を上にしてこの物体を置くと、図1の置き方に比べて、机が物体から受ける圧力は何倍になるか。



(石川県)

[解答欄]

①	②
---	---

[解答]① 2.5N ② 1.5倍

[解説]

250gの物体にはたらく重力は、 $250 \div 100 = 2.5(\text{N})$ である。

(A面) =  $30(\text{cm}) \times 10(\text{cm}) = 300(\text{cm}^2)$ で、

$$(\text{図1のときの圧力}) = 2.5(\text{N}) \div 300(\text{cm}^2) = \frac{2.5}{300} (\text{N/cm}^2)$$


(B面) =  $20(\text{cm}) \times 10(\text{cm}) = 200(\text{cm}^2)$ で、

$$(\text{図2のときの圧力}) = 2.5(\text{N}) \div 200(\text{cm}^2) = \frac{2.5}{200} (\text{N/cm}^2)$$

$$(\text{図2のときの圧力}) \div (\text{図1のときの圧力}) = \frac{2.5}{200} \div \frac{2.5}{300} = \frac{2.5}{200} \times \frac{300}{2.5} = 1.5(\text{倍})$$

[問題]

右図は、質量 120g の直方体を机の上に置いたようすを示したものである。



(1) この直方体にはたらく重力の大きさは何ニュートン[N]か、次から 1 つ選べ。

[約 0.12N 約 1.2N 約 12N 約 120N]

(2) いろいろな面をそれぞれ下にして置き、直方体が机におよぼす圧力を比べたとき、最大となる圧力は最小となる圧力の何倍か。

(秋田県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 約 1.2N (2) 2.5 倍

[解説]

(1) 質量 100g の物体にかかる重力は 1N なので、質量 120g の立方体には、 $120 \div 100 = 1.2\text{N}$  の重力がはたらく。

(2) それぞれの面の面積は、 $4(\text{cm}) \times 5(\text{cm}) = 20(\text{cm}^2)$ 、 $4(\text{cm}) \times 10(\text{cm}) = 40(\text{cm}^2)$ 、 $5(\text{cm}) \times 10(\text{cm}) = 50(\text{cm}^2)$  である。

(圧力) = (力) ÷ (面積) なので、圧力が最大になるのは底面積が最も小さい  $20\text{cm}^2$  のときである。

圧力が最小になるのは底面積が最も大きい  $50\text{cm}^2$  のときである。


(最小面積) : (最大面積) =  $20 : 50 = 2 : 5$  なので、

(最小面積のときの圧力) : (最大面積のときの圧力) =  $5 : 2$  と比が逆になる。

したがって、最大となる圧力は最小となる圧力の  $5 \div 2 = 2.5$ (倍)となる。

[問題]

右図のように、直方体の形をしたレンガ A, B がある。レンガ A の質量を 2.4kg, レンガ B の質量を 1.2kg とし、使用するスポンジはレンガより十分に大きいものとして、次の(1), (2)に答えよ。



- (1) レンガ A のそれぞれの面を下にしてスポンジの上ののせ、スポンジのへこみ方の違いについて調べた。スポンジが最も深くへこんだときにスポンジが受ける圧力の大きさは何 Pa か。ただし、質量 100g の物体にかかる重力の大きさを 1N とする。
- (2) レンガ A, B について、面 a と面 b を下にして、それぞれをスポンジの上ののせたとき、「レンガ A にかかる重力の大きさ」と「レンガ A によってスポンジが受ける圧力の大きさ」は、レンガ B のときと比べてどのようなことがいえるか。正しく説明しているものを、次のア～エから選び、記号で答えよ。
- ア 重力の大きさも圧力の大きさも同じである。
- イ 重力の大きさは同じであるが、圧力の大きさは 2 倍になる。
- ウ 重力の大きさは 2 倍になるが、圧力の大きさは同じである。
- エ 重力の大きさも圧力の大きさも 2 倍になる。

(山口県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 4000Pa (2) ウ

[解説]

(1) (圧力)=(力)÷(底面積) なので、スポンジが最も大きい圧力を受けるのは、底面積が一番小さいときである。このとき、(底面積)=0.1(m)×0.06(m)=0.006(m<sup>2</sup>) である。レンガ A の質量は 2.4kg=2400g なので、レンガ A にかかる重力は、2400÷100=24(N) である。よって、(圧力)=24(N)÷0.006(m<sup>2</sup>)=4000(Pa) となる。


(2) (1)よりレンガ A にかかる重力は 24N である。レンガ B の質量は 1.2kg なので、重力は 12N である。よって、レンガ A にかかる重力はレンガ B にかかる重力の 2 倍である。

次に、レンガ A の a 面の面積は、22(cm)×10(cm)=220(cm<sup>2</sup>) で、レンガ B の b 面の面積は、11(cm)×10(cm)=110(cm<sup>2</sup>) であるので、レンガ A の a 面の面積はレンガ B の b 面の面積の 2 倍になる。


(圧力)=(力)÷(底面積)なので、(力)、(底面積)がともに 2 倍になると、(圧力)は同じになる。

[問題]

図1のように、水平な床の上に、図2の直方体の木片を4個置き、その上に板、水の入ったバケツをのせた。直方体の各辺の長さは、3cm、4cm、6cmである。次の問いに答えよ。ただし、4個の木片は同じ面で板を均等にささえるものとする。



(1) 板と水の入ったバケツの質量の合計は6.4kgであった。このとき木片1個のささえている力の大きさは何Nか。ただし、100gの物体にはたらく重力を1Nとする。



(2) 板をささえる木片の面をP、Q、Rとかえたとき、それぞれの面にはたらく圧力の大きさについて正しく述べたものはどれか、次のア～エの中から1つ選び、その記号を書け。  
 ア P面でささえたときは、Q面でささえたときより、圧力は2倍になる。  
 イ Q面でささえたときは、R面でささえたときより、圧力は1.5倍になる。  
 ウ R面でささえたときは、P面でささえたときより、圧力は0.75倍になる。  
 エ どの面でささえても圧力の大きさはかわらない。

(青森県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 16N (2) イ

[解説]

(1)  $6.4\text{kg}=6400\text{g}$  なので、板と水の入ったバケツにはたらく重力の合計は  $6400 \div 100 = 64(\text{N})$  になる。 $64\text{N}$  の力が4個の木片にかかっているので、1個あたり  $64(\text{N}) \div 4 = 16(\text{N})$  の力がかかる。

(2) (P面の面積) $=6(\text{cm}) \times 4(\text{cm}) = 24(\text{cm}^2)$ 、(Q面の面積) $=3(\text{cm}) \times 4(\text{cm}) = 12(\text{cm}^2)$   
 (R面の面積) $=3(\text{cm}) \times 6(\text{cm}) = 18(\text{cm}^2)$

よって、(P面の面積) : (Q面の面積) : (R面の面積) $=24 : 12 : 18 = 4 : 2 : 3$  になる。


アは誤り。Pの面積はQの面積の  $\frac{4}{2} = 2$  倍になる。(圧力) $=$ (力) $\div$ (面積)なので、力が同じ

で面積が2倍になると、圧力は  $\frac{1}{2}$  倍になる。

イは正しい。Qの面積はRの面積の  $\frac{2}{3}$  倍になるので、圧力は  $\frac{3}{2} = 1.5$  倍になる。

[問題]

円柱のおもりA, おもりBは, 質量がどちらも同じで, 底面積がそれぞれ  $25\text{cm}^2$ ,  $100\text{cm}^2$  である。このおもりA, おもりBを組み合わせて, ア～エのように水平な台の上に置いた。大気圧は考えないものとして, 台がおもりから受ける圧力の大きさが, 大きい方から2番目のものは, ア～エのうちのどれか。



(岡山県)

[解答欄]

[解答]ウ

[解説]

アを基準に考える。

イはアとくらべて重力は $\frac{3}{2}$ 倍, 底面積は $\frac{1}{4}$ 倍( $25 \div 100$ )なので, 圧力は $\frac{3}{2} \times \frac{4}{1} = 6$ 倍になる。


ウはアとくらべて重力は同じで, 底面積は $\frac{1}{4}$ 倍なので, 圧力は $1 \times \frac{4}{1} = 4$ 倍になる。

エはアとくらべて重力は $\frac{3}{2}$ 倍, 底面積は同じなので, 圧力は $\frac{3}{2} = 1.5$ 倍になる。

したがって, 圧力の大きい順に並べると, イ, ウ, エ, アとなる。

[問題]

2つの物体 X, Y があり, どちらも一辺が 1cm の正方形を底面とし, 高さが 4cm の直方体であるが, 物体 X の重さは, 物体 Y の重さの 3 倍である。これらの物体を水平な机の上に, 次の A~D のような向きに置き, 物体が机を押す圧力の大きさをそれぞれ  $a \sim d$  とする。このとき,  $a, b, c, d$  の大小関係を不等号を用いて表せ。



(神奈川県)

[解答欄]

[解答]  $a > b > c > d$

[解説]

A, B のように置いたときの底面積は  $1(\text{cm}) \times 1(\text{cm}) = 1(\text{cm}^2)$  で,

C, D のように置いたときの底面積は  $1(\text{cm}) \times 4(\text{cm}) = 4(\text{cm}^2)$  である。

(圧力) = (力) ÷ (底面積) なので, 質量が一番小さく, 底面積が一番大きい D の場合に圧力は最小になる。そこで, D を基準にして考える。


A は D と比べると, 重力は 3 倍で, 底面積は  $\frac{1}{4}$  倍なので, 圧力  $a$  は  $3 \times \frac{4}{1} = 12$  倍になる。

B は D と比べると, 重力は同じで, 底面積は  $\frac{1}{4}$  倍なので, 圧力  $b$  は  $1 \times \frac{4}{1} = 4$  倍になる。

C は D と比べると, 重力は 3 倍で, 底面積は同じなので, 圧力  $c$  は  $3 \times 1 = 3$  倍になる。したがって, 圧力の大小関係は,  $a > b > c > d$  となる。

[問題]

図1のような正方形の板A、Bを用いて、圧力の実験を行った。図2のように、スポンジの上に板Aと水を400g入れた紙コップを置いたところ、スポンジに圧力が加わり、へこんだ。図3のように、板Bを用いてスポンジに図2と同じ大きさの圧力を加えるためには、紙コップに水を何g入れればよいか。ただし、板A、B、紙コップの質量は考えないものとし、100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとする。



(青森県)

[解答欄]

[解答]144g

[解説]

400gの物体に働く重力は4Nである。板Aの面積は $0.1(\text{m}) \times 0.1(\text{m}) = 0.01(\text{m}^2)$ なので、  
(図2の場合の圧力) = (力) ÷ (Aの面積) =  $4(\text{N}) \div 0.01(\text{m}^2) = 400(\text{Pa})$

図2と図3の圧力を同じにするので、(図3の場合の圧力) = (力) ÷ (Bの面積) =  $400(\text{Pa})$

また、板Bの面積は $0.06(\text{m}) \times 0.06(\text{m}) = 0.0036(\text{m}^2)$ なので、

(力) =  $400(\text{Pa}) \times (\text{Bの面積}) = 400(\text{Pa}) \times 0.0036(\text{m}^2) = 1.44(\text{N})$

よって、(水の質量) =  $1.44 \times 100 = 144(\text{g})$

[圧力の意味]




[問題]

面にはたらく力を調べる実験を行った。次の問いに答えよ。

スキー場に行った S さんは、スキー靴で雪の上を歩こうとするとスキー靴がもぐってしまった。しかし、スキー靴にスキー板をつけて歩くともぐらなかったのに、雪が受ける圧力が小さくなるからではないかと考え、そのことを確かめる実験を行った。

[実験]

1. 図 1 のように、4kg の直方体 A と 2kg の直方体 B を用意した。
2. 図 2 のように、スポンジの上に直方体 A を水平にのせ、スポンジのへこむ深さを測定した。
3. 図 3 のように、2 と同じスポンジの上に、直方体 A をのせた直方体 B を水平になるようにのせ、スポンジのへこむ深さを測定したところ、2 で測定したときよりも小さな値になった。



- (1) 図 3 で、直方体 B の底面からスポンジが受ける圧力は、図 2 で直方体 A の底面からスポンジが受ける圧力の何倍になるか。ただし、1kg の物体にはたらく重力の大きさを 10N とする。
- (2) S さんは、スキー靴にスキー板をつけたときと同じように、圧力が小さくなる現象を日常生活の中からさがした。次のア～エの中から、圧力が小さくなる現象を 1 つ選び、その記号を書け。
  - ア せん抜きを使うと、びんのせんを簡単に開けることができる。
  - イ くいは、先をとがらせると地面に打ち込みやすくなる。
  - ウ リュックサックの肩ひもは、幅を広くとすると肩に食い込みにくくなる。
  - エ ドライバー(ねじ回し)を使うと、簡単にねじを回すことができる。

(埼玉県)



[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 0.3 倍 (2) ウ

[解説]

(1) 図 2 の場合、スポンジと直方体 A が接している部分の面積は、 $0.1(\text{m}) \times 0.05(\text{m}) = 0.005(\text{m}^2)$ で、直方体 A がスポンジをおす力は、 $4 \times 10 = 40(\text{N})$ なので、 $(\text{圧力}) = (\text{力}) \div (\text{面積}) = 40(\text{N}) \div 0.005(\text{m}^2) = 8000(\text{Pa})$ となる。

図 3 の場合、スポンジと直方体 B が接している部分の面積は、 $0.5(\text{m}) \times 0.05(\text{m}) = 0.025(\text{m}^2)$ で、直方体 A と直方体 B の質量の合計は  $4 + 2 = 6(\text{kg})$ なので、直方体 B がスポンジをおす力は、 $6 \times 10 = 60(\text{N})$ になる。


したがって、 $(\text{圧力}) = (\text{力}) \div (\text{面積}) = 60(\text{N}) \div 0.025(\text{m}^2) = 2400(\text{Pa})$ となる。以上より、図 3 でスポンジが受ける圧力は、図 2 でスポンジが受ける圧力の  $2400(\text{Pa}) \div 8000(\text{Pa}) = 0.3(\text{倍})$ になる。

(2) アとエは圧力とは関係がない。

イは先をとがらせることで、くいが地面と接する部分の面積を小さくすることで圧力を大きくしている。ウは肩ひもと肩がふれ合う部分の面積を大きくすることによって圧力を小さくしている。

[問題]

図 1, 図 2 のような実験を見て、なぜこのような現象が起こるのかを考えた。



発泡ポリスチレンの台

[実験]

図 1 のように発泡ポリスチレンの台に 1 本のつまようじの先端を突き刺して立て、その上からゼリーをのせるとつまようじに突き刺さり、ゼリーは発泡ポリスチレンの台に落ちた。一方、図 2 のようにつまようじの本数を増やした場合は、同じ種類のゼリーをのせてもつまようじに突き刺さらず、ゼリーは支えられた。先生から、この現象は、新雪の上をスキーぐつで歩くとときとスキー板をつけて歩くとときの比較を手がかりにして考えればよいとアドバイスを受けた。

- (1) 同じ人が新雪の上をスキーぐつで歩くときとスキー板をつけて歩くときでは、新雪へのめりこみ方はどちらが大きいか。
- (2) スキーぐつをはいて体重 500N(質量約 50kg)の人が立っているとき、地面にはたらく圧力の大きさを求め、単位とともに書け。ただし、左右のスキーぐつの底面積の合計は  $0.04\text{m}^2$  とする。
- (3) 実験 1 について説明した次の文の①、②の( )内から適語を選べ。

図 1 の現象をスキーぐつで歩くときと対応させ、図 2 の現象をスキー板をつけて歩くときと対応させて考えた。ゼリーをつまようじ 1 本にのせた場合に比べて、図 2 のようにつまようじの数を増やしてのせた場合は、ゼリーを支える①(力/面積/圧力)が大きくなり、つまようじにかかる②(面積/圧力)は小さくなる。よって、図 2 のようにゼリーはつまようじに支えられた。

(兵庫県)

[解答欄]

(1)	(2)	(3)①	②
-----	-----	------	---

[解答](1) スキーぐつで歩くとき (2)  $12500\text{Pa}(12500\text{N}/\text{m}^2)$  (3)① 面積 ② 圧力

[解説]

(1) (圧力)=(力) $\div$ (面積) なので、新雪とふれ合う部分の面積が小さいスキーぐつの場合は圧力が大きくなり、新雪とふれ合う部分の面積が大きいスキー板の場合は圧力が小さくなる。

(2) (圧力)=(力) $\div$ (面積) $=500(\text{N})\div 0.04(\text{m}^2)=12500(\text{Pa})$

[問題]

私たちは、生活のさまざまな場面で、力が加わる時、圧力を大きくしたり小さくしたりする工夫をしている。たとえば、圧力を大きくする工夫として、壁にさしやすくするために、画びょうの先をとがらせて面積を小さくしている。では、圧力を小さくする工夫として、どのような例があるか。下線部を参考にして、具体的な例を 1 つ、簡潔に書け。

(福岡県)

[解答欄]

[解答]雪にめりこみにくくするために、スキーをはいて雪とふれ合う面積を大きくしている。

[問題]

右図のように紙コップを水平な床の上に並べ、その上に板をのせて人が静かにのった。紙コップが3個のときにはつぶれたが、9個ではつぶれなかった。



- (1) 紙コップを9個に増やしたとき、紙コップがつぶれなかったのはなぜか。
- (2) 同じ人が高さ50cmの台の上から9個の紙コップにのせた板の上へ飛びおりると紙コップはつぶれた。このことを説明した次の文の( )に入る適切な語句を書け。

50cmの高さの台にのることによって、人のもつ( )が大きくなり、飛びおりると紙コップがつぶれた。

(兵庫県)

[解答欄]

(1)
(2)

[解答](1) 紙コップの数が増えると紙コップ1個あたりにかかる力が小さくなるため。(2) 位置エネルギー

[問題]

次の文の①, ②にあてはまる言葉を、下の[ ]の中からそれぞれ1つずつ選べ。

直也さんは両足で体重計にのっている状態から、静かに右足を上げた。このとき、体重計の示す値は( ① )。また、左足の裏にかかる圧力は( ② )。ただし、足の裏の面積は左右とも同じものとする。

[ 半分になる 変わらない 2倍になる ]

(茨城県)

[解答欄]

①	②
---	---

[解答]① 変わらない ② 2倍になる


[圧力とスポンジのへこみ方]

[問題]

物体がふれ合う面積と圧力の関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、このスポンジのへこむ深さは、圧力の大きさに比例するものとする。

[実験]

ふたの付いた直方体の容器に砂を入れ、全体の重さを  $6.0\text{N}$ (ニュートン)とした。図1から図2のようにして、容器をスポンジにのせたときのスポンジのへこむ深さを調べた。このとき、容器がスポンジとふれあう面積は  $50\text{cm}^2$ であった。次に、図3のように、容器の向きを変えてスポンジとふれ合う面積を  $150\text{cm}^2$ にし、スポンジのへこむ深さを調べた。



- (1) 図2において、スポンジが容器から受ける圧力は何 Pa か。
- (2) 図3において、図2と同じ深さだけスポンジをへこませるには、容器全体の重さを何 N にすればよいか。

(長野県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1)  $1200\text{Pa}$  (2)  $18\text{N}$

[解説]

(1)  $1(\text{m}^2) = 100(\text{cm}) \times 100(\text{cm}) = 10000(\text{cm}^2)$ なので、 $50\text{cm}^2 = 50 \div 10000 = 0.005\text{m}^2$

したがって、(圧力) = (力) ÷ (面積) =  $6.0(\text{N}) \div 0.005(\text{m}^2) = 1200(\text{Pa})$

(2) 図2と図3のように容器の置き方を変えても、スポンジにはたらく圧力が同じならスポンジのへこむ深さは同じになると考えられる。

したがって、図3において、図2と同じ深さだけスポンジをへこませるには、圧力を図2の場合と同じ  $1200(\text{N}/\text{m}^2)$ にすればよい。


(圧力) = (力) ÷ (面積)なので、(力) = (圧力) × (面積)

(面積) =  $150(\text{cm}^2) = 0.015(\text{m}^2)$ なので、


(力) =  $1200(\text{Pa}) \times 0.015(\text{m}^2) = 18(\text{N})$ となる。

[問題]


各辺の長さが 10.0cm, 10.0cm, 4.5cm の直方体のスポンジを水平な机の上に置いた。図 1 のように、スポンジの上に質量 0.25kg の板を置き、



板を水平に保ちながら、質量の異なるおもりをのせて、スポンジの厚さを測ると、図 2 の点(●)のようになった。次の問いに答えよ。



- (1) 板の上に質量 0.75kg のおもりをのせたとき、板とおもりによってスポンジにはたらく圧力は何 Pa か。ただし、0.10kg の物体にはたらく重力を 1N とする。
- (2) 図 3 のように、図 1 のスポンジを各辺の長さが 8.0cm, 8.0cm, 4.5cm の直方体に切りとった。おもりの質量が 0.55kg のとき、スポンジの厚さは何 cm になるか。



(富山県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 1000Pa (2) 3.0cm

[解説]

(1) 板とおもりの質量の合計は、 $0.25(\text{kg}) + 0.75(\text{kg}) = 1.00(\text{kg})$ で、これにはたらく重力は  $10(\text{N})$ である。また、板とスポンジが接する部分の面積は、 $0.1(\text{m}) \times 0.1(\text{m}) = 0.01(\text{m}^2)$ である。したがって、 $(\text{圧力}) = (\text{力}) \div (\text{面積}) = 10(\text{N}) \div 0.01(\text{m}^2) = 1000(\text{Pa})$ となる。

(2) 図 3 で、板とおもりの質量の合計は、 $0.25(\text{kg}) + 0.55(\text{kg}) = 0.80(\text{kg})$ で、これにはたらく重力は  $8(\text{N})$ である。板とスポンジが接する部分の面積は、 $0.08(\text{m}) \times 0.08(\text{m}) = 0.0064(\text{m}^2)$ である。したがって、 $(\text{圧力}) = (\text{力}) \div (\text{面積}) = 8(\text{N}) \div 0.0064(\text{m}^2) = 1250(\text{Pa})$ となる。図 1 と図 3 の場合で、圧力が同じであるならスポンジの厚さは同じになると考えられる。そこで、図 1 でスポンジにかかる圧力が  $1250\text{Pa}$ になるときの板とおもりの質量の合計を求め、図 2 を使ってスポンジの厚さを求める。

$(\text{圧力}) = (\text{力}) \div (\text{面積})$ なので、 $(\text{力}) = (\text{圧力}) \times (\text{面積}) = 1250(\text{Pa}) \times 0.01(\text{m}^2) = 12.5\text{N}$

板とおもりにはたらく重力の大きさが  $12.5\text{N}$ になるのは、板とおもりの質量の合計が  $12.5 \times 0.1 = 1.25(\text{kg})$ のときである。


図 2 より、板とおもりの質量の合計が  $1.25\text{kg}$ のときのスポンジの厚さは  $3.0\text{cm}$ である。

【】 水圧

[水圧の向き]

[問題]

下の図は、水中の物体にはたらく水圧の方向と大きさを示した模式図である。最も適当なものを次のア～エから 1 つ選んで記号で答えよ。



(沖縄県)

[解答欄]

[解答]イ

[解説]

水圧は、水と接している面に垂直に、水→物体の方向に働く。たとえば、図 1 のような物体では水圧は上下左右のあらゆる方向から働く。水圧の働く方向について、右下の図 2 を使って少し詳しく説明する。水を構成している最小の粒は水の分子である。水の分子は自由に動き回っている。水中にある直方体の A 面には下方向に運動する水分子が衝突してはね返される。このとき A 面は下方向の力を受ける。B 面には上方向に運動する水分子が衝突してはね返され、B 面は上方向の力を受ける。側面 C には右方向に運動する水分子が衝突してはね返され、C 面は右方向の力を受ける。同様に、側面 D は左方向の力を受ける。

図1 (水中)






図2 (水中)



以上から、水中にある物体に働く水圧は、「水と接している面に垂直に、水→物体の方向に働く。」ことがわかる。

図 3 のように、水中にある直方体の物体の場合、上部の面 A には、下方向に水圧がかかる。下部の面 B には、上方向(水→物体の方向)の水圧がかかる。B 面は A 面より深いので B 面にかかる水圧は A 面にかかる水圧より大きい。(B の矢印が A の矢印より長くすることで水圧の違いを表している。)


図3 (水中)



側面 C には右方向(水→物体)の水圧がかかる。深くなるほど水圧が大きくなるので、下へ行くほど矢印は長くなる。側面 D には左方向の(水→物体)の水圧がかかる。矢印は側面 C の場合と対称になる。

**【問題】**

円筒の両端にうすいゴム膜をはり、円筒の中央付近にゴム管をとりつけた装置をつくり、右の図のように水中に入れたら、それぞれのゴム膜は a～d のようにへこんだ。



(1) 次の文の①～④の( )内より適語を選べ。

水圧は、a では①(上/下/右/左)向き、b では②(上/下/右/左)向き、c では③(上/下/右/左)向きに、d では④(上/下/右/左)向きにはたらいていることがわかる。

(2) a と b のへこみかたの違いからどのようなことがわかるか。

(補充問題)


**【解答欄】**

(1)①	②	③	④
(2)			

**【解答】**(1)① 下 ② 上 ③ 右 ④ 左 (2) 水深が深いほど水圧の大きさが大きくなる。

**【解説】**



右の図のように、a の面では面に垂直に下向きに(正確には、面に垂直に水→ゴム膜の方向に働くので、左下向き、下向き、右下向きに働く)、b では面に垂直に上向きに働く。c では面に垂直に右向きに、d では面に垂直に左向きに働く。水深が深くなればなるほど、その上のにっている水の重さは大きくなり、水圧は大きくなる。したがって、図1のb



にかかる水圧は a にかかる水圧より大きくなり、b のゴム膜のへこみ方は a のゴム膜のへこみ方より大きくなる。

**【問題】**

水の圧力について調べるために、右図のような水圧実験装置を用意して実験を行った。図のように、2 つのゴム膜が上下になるようにして水圧実験装置を水中に入れ、ゴム膜の変化を観察した。このとき、2 つのゴム膜はどのような形になるか。最も適当なものを、次のア～オの中から1つ選び、記号を書け。



(佐賀県)

[解答欄]

[解答]イ

[水圧の大きさ]

[問題]

水面から 2m の深さにおける水圧の大きさは何 Pa か。ただし、質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。

(補充問題)

[解答欄]

[解答]20000Pa

[解説]

まず、水面から 1m の深さにある面積が  $1\text{m}^2$  の A 面が受ける水の重さによる力を求める。A 面の上のっている水の体積は、

$1(\text{m}) \times 1(\text{m}) \times 1(\text{m}) = 1(\text{m}^3)$  である。水  $1\text{cm}^3$  の質量は 1g である。

質量 100g の物体にかかる重力の大きさは約 1N なので、

質量  $1000\text{kg} = 1000000\text{g}$  にかかる重力は、 $1000000 \div 100 = 10000(\text{N})$

である。以上より、深さ 1m のときの水の重さによる圧力(水圧)は、 $10000\text{N}/\text{m}^2$  であることがわかる。同様に、深さが 2m である B 面にかかる水圧は、 $10000 \times 2 = 20000\text{N}/\text{m}^2$  である。 $1\text{N}/\text{m}^2 = 1\text{Pa}$  なので、 $20000\text{N}/\text{m}^2 = 20000\text{Pa}$  である。

※深さが 1cm の水圧は、

$$(\text{水深}1\text{cmの水圧}) = 100\text{Pa} = 100\text{N}/\text{m}^2$$


$10000 \div 100 = 100\text{N}/\text{m}^2 = 100\text{Pa}$  である。これを、覚えておくと計算が楽になる。

[問題]

深さ 10cm の水面下の水圧の大きさは何 Pa か。

(千葉県)

[解答欄]






[解答]100Pa

[問題]

次の各問いに答えよ。

- (1) おもりを、図の a, b のように沈めたとき、a の場合のおもりの底面にはたらく水圧を A, b の場合のおもりの上面にはたらく水圧を B, 底面にはたらく水圧を C とする。次のア～オの中で、A, B, C の大小関係を正しく表しているものを 1 つ選べ。



- ア  $A > B > C$     イ  $A < B = C$   
ウ  $A = B = C$     エ  $A = B < C$     オ  $A = C > B$

- (2) 大小関係が(2)のようになる理由を書け。

(福島県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) エ (2) 水圧は水の深さに比例して大きくなるから。


[解説]

水圧は水の深さに比例して大きくなる。したがって、 $B < C$  である。  
また、深さが同じなら水圧の大きさは等しいので、 $A = B$  である。

[水圧の実験]

[問題]

右図のように、プラスチック板を円筒に当てて水が円筒内に入らないようにして水そうの中に沈め、質量が 300g のおもりをプラスチック板の上に静かにのせ、円筒をゆっくり上げていく。プラスチック板が円筒からはなれるときの水の深さは何 cm か。ただし、円筒の断面積は  $20\text{cm}^2$  とし、プラスチック板の重さは考えないものとする。また、質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。



(愛知県)

[解答欄]

[解答]15cm

[解説]

プラスチック板が円筒からはなれるときの水の深さを  $x$  cm とする。

深さが  $x$  cm のときの水圧は、 $100 \times x$  (Pa) =  $100 \times x$  (N/m<sup>2</sup>) である。

円筒の断面積は  $20\text{cm}^2 = 20 \div 10000 = 0.002$  m<sup>2</sup> なので、

(板が水圧によって受ける上向きの力) =  $100 \times x$  (N/m<sup>2</sup>)  $\times$   $0.002$  (m<sup>2</sup>) =  $0.2 \times x$  (N)

(板がおもりから受ける下向きの力) =  $300 \div 100 = 3$  (N) である。

(板が水圧によって受ける上向きの力) = (板がおもりから受ける下向きの力) なので、


$0.2 \times x = 3$  よって、 $x = 3 \div 0.2 = 15$  (cm)

[問題]

水の圧力が深さによってどのように変わるかを調べるために、次の手順で実験をした。

[実験]


図1のように、目盛りのついた円筒の下に軽くてうすいプラスチック板をあてて水中に沈める。次に図2のように、プラスチック板の上におもりをのせ、円筒をゆっくり引き上げていき、円筒からプラスチック板がはなれるときの水面からの深さを測定した(図3)。



おもりの質量をいろいろ変えて同じ実験をした。表は、このときの測定結果である。次の各問いに答えよ。

おもりの質量(g)	50	100	150	200
プラスチック板がはなれるときの水の深さ(cm)	1.8	3.6	5.4	7.2

(1) 円筒からプラスチック板がはなれていないとき(図2)、プラスチック板にはたらく水の圧力  $P$  とおもりによる圧力  $Q$  の関係を正しく示しているのはどれか。次のア～エのうちから1つ選んで、その記号を書け。



(2) プラスチック板に 300g のおもりをのせた。円筒からプラスチック板がはなれるときの水の深さは何 cm か。次の[ ]のうちから 1 つ選べ。

[ 9.0cm 10.8cm 12.6cm 14.4cm ]

(3) 円筒をゆっくり引き上げるとき、円筒からプラスチック板がある深さではなれる理由について、正しいのはどれか。次のア～エのうちから 1 つ選んで、その記号を書け。

ア プラスチック板にはたらく大気からの圧力が小さくなるから。

イ プラスチック板にはたらく水の圧力が小さくなるから。

ウ プラスチック板にはたらく水の圧力が大きくなるから。

エ プラスチック板にはたらくおもりによる圧力が大きくなるから。

(沖縄県)

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答](1) エ (2) 10.8cm (3) イ

[解説]

(1)(3) 水の深さが十分に深いときは、(1)のエのように、

(水の圧力  $P$ ) > (おもりによる圧力  $Q$ ) であるので、プラスチック板は円筒に押しつけられた状態である。

円筒を引き上げていくと、プラスチック板の水深は浅くなるので、プラスチック板にはたらく水の圧力が小さくなっていき、やがて(水の圧力  $P$ ) = (おもりによる圧力  $Q$ ) となる。これよりも、少し浅くなった時点で、(水の圧力  $P$ ) < (おもりによる圧力  $Q$ ) となり、プラスチック板は円筒からはなれる。

(2) 表から、おもりの質量が、50g, 100g, 150g, 200g と 2 倍, 3 倍, 4 倍になっていくと、プラスチック板がはなれるときの水の深さは、1.8cm, 3.6cm, 5.4cm, 7.2cm と 2 倍, 3 倍, 4 倍になることがわかる。

100g のときは 3.6cm なので、300g のときは、 $3.6(\text{cm}) \times 3 = 10.8(\text{cm})$  でプラスチック板がはなれることがわかる。

【】 浮力

[浮力]

[問題]

密度が  $7\text{g}/\text{cm}^3$  で体積が  $10\text{cm}^3$  の金属がある。この金属を図のようにばねばかりにつるして水中に沈めると、ばねばかりの目もりは  $0.6\text{N}$  であった。水中でこの金属にはたらく浮力の大きさは何  $\text{N}$  か。ただし、 $100\text{g}$  の物体にはたらく重力は  $1\text{N}$  とする。

(茨城県)

[解答欄]

[解答]  $0.1\text{N}$

[解説]

この金属の質量は、 $7(\text{g}/\text{cm}^3) \times 10(\text{cm}^3) = 70(\text{g})$  である。 $100\text{g}$  の物体にはたらく重力は  $1\text{N}$  なので、この金属に働く重力は、 $70 \div 100 = 0.7(\text{N})$  である。(ばねが引く力) + (浮力) = (重力)、 $0.6 + (\text{浮力}) = 0.7$  よって、(浮力) =  $0.7 - 0.6 = 0.1(\text{N})$

[問題]

もとの長さが  $10\text{cm}$  で、 $1\text{N}$  の力を加えると  $10\text{cm}$  のびるばねがある。このばねにつるした質量  $30\text{g}$  の物体を静かに水中に沈めた。物体が静止したときのばねの長さは  $12\text{cm}$  であった。物体にはたらく浮力の大きさは何  $\text{N}$  か。ただし、質量  $100\text{g}$  の物体にはたらく重力の大きさを  $1\text{N}$  とする。




(秋田県(旧))

[解答欄]

[解答]  $0.1\text{N}$

[解説]


このばねは、 $1\text{N}$  の力を加えると  $10\text{cm}$  のびるので、 $0.1\text{N}$  の力で  $1\text{cm}$  のびる。ばねののびは、 $12 - 10 = 2(\text{cm})$  であるので、物体をばねが上向きに引く力は、 $0.1(\text{N}) \times 2 = 0.2(\text{N})$  である。この物体の質量は  $30\text{g}$  なので、物体にはたらく重力の大きさは、 $30 \div 100 = 0.3(\text{N})$  である。(ばねが引く力) + (浮力) = (重力)、 $0.2 + (\text{浮力}) = 0.3$  よって、(浮力) =  $0.3 - 0.2 = 0.1(\text{N})$



[問題]

物体が水中で受ける力について、次の①、②にあてはまる語句を、それぞれ書け。

図のように、水中にある物体は、図の a で示される下向きの力である( ① )と、図の b で示される上向きの力である( ② )を受ける。



(群馬県)

[解答欄]

①	②
---	---


[解答]① 重力 ② 浮力

[浮力の根拠]

[問題]

下の文が、右図の直方体が水から受ける力について述べたものとなるよう、①～③にあてはまる語を書け。ただし、上面と下面は水面に平行とする。

側面の a が受ける圧力は、b が受ける圧力よりも( ① )。しかし、向かい合う側面が受ける圧力は、同じ深さでは等しいので、互いに打ち消し合う。また、下面が受ける圧力は上面が受ける圧力よりも( ② )なので、この直方体は全体として( ③ )に向かう力を受ける。



(群馬県(旧))

[解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① 小さい ② 大きい ③ 上

[解説]

右図のように、水より密度が大きい底面積が  $10\text{cm}^2$  で、高さが  $6\text{cm}$  の直方体を水の中にいれたときを例にとって、浮力がはたらく根拠と浮力の大きさを考える。

$$(水深1\text{cmの水圧})=100\text{Pa}=100\text{N}/\text{m}^2$$


上の面の水深は  $4\text{cm}$  なので、

$$\text{水圧は、} 100(\text{Pa}) \times 4(\text{cm}) = 400(\text{Pa}) = 400(\text{N}/\text{m}^2) = 0.04(\text{N}/\text{cm}^2)$$

底面積は  $10\text{cm}^2$  なので、

$$(\text{上の面が受ける下向きの力}) = 0.04(\text{N}/\text{cm}^2) \times 10(\text{cm}^2) = 0.4(\text{N})$$

同様に、下の面の水深は  $10\text{cm}$  なので、



水圧は  $100(\text{Pa}) \times 10(\text{cm}) = 1000(\text{Pa}) = 1000(\text{N}/\text{m}^2) = 0.1(\text{N}/\text{cm}^2)$

よって、(下の面が受ける上向きの力)  $= 0.1(\text{N}/\text{cm}^2) \times 10(\text{cm}^2) = 1.0(\text{N})$

以上より、上向きの力が、 $1.0 - 0.4 = 0.6(\text{N})$  大きい。水圧の差によるこの力を浮力<sup>うきりき</sup>という。なお、側面が水圧によって受ける力は、左右、前後がつりあうので、あわせた力は 0 になる。


次に、浮力と物体の水の中にある部分の体積との関係について考える。

この物体の体積は  $10(\text{cm}^2) \times 6(\text{cm}) = 60(\text{cm}^3)$  である。体積が  $60\text{cm}^3$  である水にかかる重力の大きさは  $0.6\text{N}$  である。これは、さきに計算した浮力の大きさと同じになる。

これは偶然ではなく、常に成り立つ。すなわち、「浮力は水中にある物体がおしのけた体積分の水の重さに等しくなる」という原理が成り立つ。

この原理は、次のようにして説明できる。

右の図 1 のように水そうの中に、容器 A を入れる。容器 A は厚さが 0 で、質量も 0 とする。容器 A の中には水を入れておくものとする。A を静かに水そうの中に入れる。容器 A の密度は水の密度とまったく同じになるので、容器 A は水




そうの中で静止した状態を続けるはずである。容器 A にはたらく力は A にかかる重力と浮力である。容器 A が静止状態を続けることより、この 2 力はつりあっていると判断できる。

したがって、(浮力) = (物体がおしのけた体積分の水の重さ) が成り立つことがわかる。


図 2 のように、A と同じ容器 B を用意し、中の水をぬいた状態で水の中に沈めると、容器 B には浮力のみが働き、手をはなすと容器 B は上向きに浮上する。

(浮力) = (水中にある物体の体積分の水の重さ)

例)  体積 100cm<sup>3</sup> → 浮力 100g → 1N

### [問題]

次の文は、右図のような直方体の物体がすべて水中にあるときの水圧について述べたものである。文中の①～③の( )内からそれぞれ適語を選べ。



物体にはたらく水圧は、上面に①(上/下)向きにはたらく水圧よりも、下面に②(上/下)向きにはたらく水圧の方が大きいので、物体には③(上/下)向きの力がはたらく。この力が浮力である。

(沖縄県)


[解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① 下 ② 上 ③ 上

[問題]

右図は、底面積  $6.0\text{cm}^2(0.0006\text{m}^2)$  で、高さが  $10\text{cm}$  の直方体Aが水の中にあるときにはたらく水圧のようすを模式的に示したもので、矢印は水圧の向きと大きさを表している。この図を参考にして、次の説明が正しくなるように、①～③にあてはまる内容や数値をそれぞれ書け。ただし、 $100\text{g}$  の物体にはたらく重力は  $1\text{N}$  とする。



Aについて、

下面をおす力の大きさは、下面にはたらく水圧×面積

上面をおす力の大きさは、上面にはたらく水圧×面積

で表される。よって、Aにはたらく浮力の大きさは、( ① )×面積 の式で表される。

Aの下面にはたらく水圧と上面にはたらく水圧の差は( ② )Paなので、浮力は

( ③ )Nとなる。また、Aの体積は  $60\text{cm}^3$ 、水の密度は  $1\text{g}/\text{cm}^3$  であることから、Aには

はたらく上向きの力の大きさは、Aと同じ体積の( ③ )の大きさに等しい。

(秋田県)

[解答欄]

①		
②	③	④

[解答]① 下面にはたらく水圧－上面にはたらく水圧 ② 1000 ③ 0.6 ④ 水にはたらく重力

[解説]

直方体 A にはたらく浮力の大きさは、下面と上面の水圧の差から求めることができる。

(A にはたらく浮力)=(下面をおす力)－(上面をおす力)

= (下面にはたらく水圧)×(面積)－(上面にはたらく水圧)×(面積)

= ((下面にはたらく水圧)－(上面にはたらく水圧))×(面積)

= (下面と上面の水圧の差)×(面積)

直方体 A の高さは  $10\text{cm}$  なので、下面と上面の水圧の差は、

$100(\text{Pa}) \times 10(\text{cm}) = 1000(\text{Pa}) = 1000(\text{N}/\text{m}^2)$

Aの底面積は  $0.0006\text{m}^2$  であるので、

(Aにはたらく浮力) $=1000(\text{N}/\text{m}^2)\times 0.0006(\text{m}^2)=0.6(\text{N})$ となる。

また、浮力の大きさは、物体がおしのけた体積分の水の重さから求めることができる。

(Aの体積) $=(\text{底面積})\times(\text{高さ})=6.0(\text{cm}^2)\times 10(\text{cm})=60(\text{cm}^3)$

水の密度は  $1\text{g}/\text{cm}^3$  であるので、

(Aの体積と同じ体積の水の質量) $=1(\text{g}/\text{cm}^3)\times 60(\text{cm}^3)=60(\text{g})$

100g の物体にはたらく重力は 1N なので、

(A の体積と同じ体積の水にはたらく重力) $=60\div 100=0.6(\text{N})$

[問題]

右図のように、直方体の物体を水の中に入れた。この物体に働く浮力の大きさは 1.2N であった。下面にはたらく水圧が 1100Pa のとき、上面にはたらく水圧は何 Pa か。ただし、上面、下面の面積はどちらも  $0.002\text{m}^2$  とする。

(岩手県)

[解答欄]

[解答]500Pa

[解説]

下面にはたらく水圧が  $1100\text{Pa}=1100\text{N}/\text{m}^2$  で、面積は  $0.002\text{m}^2$  なので、


(下面をおす力) $=1100(\text{N}/\text{m}^2)\times 0.002(\text{m}^2)=2.2(\text{N})$  である。

(物体にはたらく浮力) $=(\text{下面をおす力})-(\text{上面をおす力})=1.2(\text{N})$  なので、

$2.2(\text{N})-(\text{上面をおす力})=1.2(\text{N})$

よって、(上面をおす力) $=2.2-1.2=1.0(\text{N})$



したがって、(上面にはたらく水圧) $=1.0(\text{N})\div 0.002(\text{m}^2)=500(\text{N}/\text{m}^2)=500(\text{Pa})$





[問題]

右図のようにおもりをばねばかり(ニュートンばかり)につり下げ、水中にゆっくりと沈め、水面からの深さとおもりにはたらく力について調べた。下のグラフは水面からの深さ(横軸)とおもりが水中で受ける浮力(縦軸)との関係を示したものである。最も適当なものを次のア～エから1つ選んで記号で答えよ。ただし、水面からの深さが0cmとは、おもりの上面が水面と一致したときとする。



(沖縄県)

[解答欄]

[解答]ア

[解説]

(浮力)=(物体がおしのけた体積分の水の重さ)は、水の深さがいくらであっても成り立つ。したがって、体積が同じなら、働く浮力の大きさは水深にかかわらず一定である。よって、物体をもっと水中深くしずめたときもばねばかりの示す値は変わらない。

[問題]

浮力について、もっとも適当なものを次のア～カから2つ選んで記号で答えよ。

- ア 物体の浮力は、物体の水にしずめた部分の体積が大きいほど小さくなる。
- イ 物体の浮力は、物体の水にしずめた部分の体積が大きいほど大きくなる。
- ウ 物体の浮力は、物体の水にしずめた部分の体積に関係なく一定である。
- エ 物体の浮力は、物体がすべて水中にある場合は深くなるほど小さくなる。
- オ 物体の浮力は、物体がすべて水中にある場合は深くなるほど大きくなる。
- カ 物体の浮力は、物体がすべて水中にある場合は深さに関係なく一定である。

(沖縄県)



[解答欄]

[解答]イ, カ

[浮力の応用問題]

[問題]

直方体の物体にフックを取り付け、ばねばかりにつり下げた。次に、図のように物体を水に沈めながら、ばねばかりの値をよんだ。グラフは、水面から物体の下面までの距離と、ばねばかりの値の関係をあらわしたものである。ただし、物体に取り付けたフックとばねばかりのフックの質量と体積は考えないものとする。



- (1) 物体の重さは何 N か。
- (2) この実験で水面から物体の下面までの距離が 10cm のとき、物体にはたらく浮力は何 N か。

(長崎県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 45N (2) 10N



[解説]

(1) グラフより、水面から物体の下面までの距離が 0cm のときは、まだ水の中に入っておらず、浮力ははたらかない。このときのばねばかりの値は 45N なので、この物体にはたらく重力の大きさ(物体の重さ)は 45N であることがわかる。

(2) 水面から物体の下面までの距離が 10cm のとき、グラフよりばねばかりの値は 35N である。(1)よりこの物体の重さは 45N であるので、このときはたらく浮力の大きさは、 $45 - 35 = 10(N)$ である。

[問題]

図1のように重さ5Nの直方体の物体をばねばかりにつるし、水の入った水槽に入れ5cmごとに水面から物体の底面までの距離を変えながらばねばかりの値を測定したところ、図2のようになった。



- (1) 物体の底面が、水面から10cm沈んだときの浮力の大きさは何Nか。
- (2) 図2において、物体がすべて水中にあるときの状態を表しているものとして、もっとも適当なものをア～オから1つ選んで記号で答えよ。

(沖縄県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 1.0N (2) オ


[解説]

- (1) 図2のウは物体の底面が水面から10cm沈んだときを表している。このときのばねばかりの値は4.0Nなので、浮力の大きさは、 $5.0 - 4.0 = 1.0$ (N)である。
- (2) 図2で、水面から物体の底面までの距離が15cm以上では、ばねばかりの値が一定になっている。このことから、オで物体が全部水の中に入ったと判断できる(これ以降は、水の中にある物体の体積が一定なので浮力の大きさは変わらずばねばかりの値も一定になる)。

[問題]

20gのおもりをつるすと1cmのびるばねがある。このばねに、高さ4cmの金属製の円柱を、質量が無視できる糸でつるして、ばねの一端にとりつけ、ばねののびを測定したところ、3.5cmのびでつり合った。

次に、右図のように、ばねにつるした円柱を水中に入れた後、少しずつ下げていき、水面から円柱の底面までの距離と、そのときのばねののびを測った。水槽は十分に深く、実験中に円柱の底面が水槽の底につくことはなかった。次の表は、実験の結果をまとめたものの一部である。



水面から円柱の底面までの距離(cm)	1	2	3	4	5	6
ばねののび(cm)	3.0	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5

- (1) 円柱を全部水に入れたときに、円柱にはたらく浮力の大きさは何 N か。ただし、円柱をつるした糸にはたらく浮力は考えないものとする。
- (2) ばねにはたらく力の大きさは、円柱にはたらく浮力の大きさの変化に応じて変化する。ばねにはたらく力の大きさと円柱にはたらく浮力の大きさが等しくなるのは、水面から円柱の底面までの距離が何 cm のときか。

(大分県)

[解答欄]


(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 0.4N (2) 3.5cm

[解説]

(1) 質量 100g の物体にはたらく重力の大きさは約 1N なので、質量 20g の物体にはたらく重力の大きさは、 $20 \div 100 = 0.2(\text{N})$  である。このばねは、20g のおもりをつるすと 1cm のびるので、0.2N の力で引くと 1cm のびる。金属製の円柱をばねにつるすと 3.5cm のびるので、この円柱にはたらく重力は、 $0.2 \times 3.5 = 0.7(\text{N})$  である。水面から円柱の底面までの距離が 4cm 以上で円柱の全体が水中にあるときのばねののびは、表より 1.5cm である。このとき、ばねにかかる力は、 $0.2 \times 1.5 = 0.3(\text{N})$  である。したがって、円柱を全部水に入れたときに、円柱にはたらく浮力の大きさは、 $0.7 - 0.3 = 0.4(\text{N})$  である。

(2) ばねにはたらく力の大きさを  $F(\text{N})$  とする。ばねにはたらく力の大きさと円柱にはたらく浮力の大きさが等しくなるとき、浮力の大きさは  $F(\text{N})$  となる。ばねにはたらく力の大きさと円柱をばねが引く力の大きさは等しいので、円柱にはたらく 3 つの力は右図のようになる。円柱にはたらく重力の大きさは、(1) より 0.7N である。この 3 力はつり合っているので、 $F + F = 0.7$ 、 $F \times 2 = 0.7$ 、 $F = 0.7 \div 2 = 0.35(\text{N})$  である。



(1) より、このばねは 0.2N の力で引くと 1cm のびるので、0.35N の力では、 $0.35 \div 0.2 = 1.75(\text{cm})$  のびる。

表より、水面から円柱の底面までの距離が 3cm のときのばねののびは 2.0cm で、距離が 4cm のときのばねののびは 1.5cm である。1.75cm は 2.0cm と 1.5cm の中間なので、のびが 1.75cm のときの水面から円柱の底面までの距離は、 $(3 + 4) \div 2 = 3.5(\text{cm})$  となることがわかる。

[問題]

水の中ではたらく力について調べるために次の実験を行った。後の各問いに答えよ。ただし、糸の重さは考えないものとする。また、100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。

[実験]

- ① 図 1 の物体(直方体)を、図のような向きでばねばかりにつるしたところ、ばねばかりの目もりの値は 2.4N であった。
- ② ①でばねばかりにつるした物体を、図 2 のように水そうに入れ、水面から物体の底面までの距離が 5.0cm になるまで 1.0cm ずつ沈めていき、そのときのばねばかりの目もりの値を調べた。下の表は、その結果を示したものである。

図1






図2



水面から物体の底面までの距離(cm)	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
ばねばかりの目もりの値(N)	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	a

- ③ 図 1 の物体を 2 個用意し、それらを図 3 のような向きで上下にすき間なくつなぎ、ばねばかりにつるした。ばねばかりにつるしたそれらの物体を水そうに入れ水面から下の物体の底面までの距離が 6.0cm になるように沈めた。

図3




- (1) 実験の②で、水面から物体の底面までの距離が 4.0cm のときについて、次の問いに答えよ。

- 1) 物体にはたらく重力の大きさは何 N か。
- 2) 物体にはたらく浮力の大きさは何 N か。

- (2) 実験の②で、表の a にあてはまる数値を予想して、水面から物体の底面までの距離とばねばかりの目もりの値との関係をグラフに書け。

- (3) 実験の③の下線部のとき、ばねばかりの目もりの値は何 N か。


(佐賀県)



[解答欄]

(1)1)	2)
(2) <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; margin-right: 5px;">ばねばかりの目もりの値 (N)</div> </div>	
(3)	

[解答](1)1) 2.4N    2) 0.8N    (2)




(3) 3.6N

[解説]

- (1) 物体にはたらく重力の大きさはつねに 2.4N である。  
 水面から物体の底面までの距離が 4.0cm のとき、ばねばかりの目もりの値は 1.6N なので、この物体に働く浮力の大きさは、 $2.4 - 1.6 = 0.8(N)$  である。
- (2) この物体(直方体)の高さは 4cm であるので、水面から物体の底面までの距離が 4cm になるまでは、この物体が水の中にある体積は、底面までの距離と比例して大きくなっていき、浮力の大きさも比例して大きくなっていく。しかし、水面から物体の底面までの距離が 4cm 以上になると、この物体が水の中にある体積は一定になるので、浮力も一定になる。したがって、表の a の値は、水面から物体の底面までの距離が 4cm のときと同じ 1.6N になる。
- (3) ②の表より、水の中にあるこの物体の水面からの距離が 1cm 大きくなるごとに、ばねばかりの値は 0.2N ずつ小さくなる。実験の③のときの、2 個の物体を重ねた物体(直方体)の高さは  $4 + 4 = 8(\text{cm})$  なので、下の物体の底面までの距離が 6.0cm のとき、ばねばかりの値は  $0.2(N) \times 6 = 1.2(N)$  小さくなる。この物体 2 個分の重さは、 $2.4(N) \times 2 = 4.8(N)$  であるので、ばねばかりの値は、 $4.8 - 1.2 = 3.6(N)$  になる。

[問題]

図 1 は糸につるしたおもりをすべて水に入れたとき、  
図 2 は同じおもりを半分水に入れたときの模式図である。  
次の各問いに答えよ。



- (1) 図 1 と図 2 のおもりにはたらく重力の大きさについて、正しく述べているものは、次のア～ウのどれか。
- ア おもりにはたらく重力は、図 1 のほうが図 2 に比べて大きい。
  - イ おもりにはたらく重力は、図 2 のほうが図 1 に比べて大きい。
  - ウ おもりにはたらく重力は、図 1、図 2 とともに等しい。
- (2) 図 1 と図 2 のおもりにはたらく浮力の大きさについて、正しく述べているものは、次のア～ウのどれか。
- ア おもりにはたらく浮力は、図 1 のほうが図 2 に比べて大きい。
  - イ おもりにはたらく浮力は、図 2 のほうが図 1 に比べて大きい。
  - ウ おもりにはたらく浮力は、図 1、図 2 とともに等しい。

(鹿児島県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----


[解答](1) ウ (2) ア

[解説]

- (1) 図 1 と図 2 のおもりは同じものなので、質量は等しい。質量が同じ物体にはたらく重力の大きさは、空気中でも水中でもすべて等しい。
- (2) 浮力の大きさは、物体の水中にある部分の体積と同じ体積の水にはたらく重力の大きさと等しい(アルキメデスの原理)ので、水中にある部分の体積が大きい図 1 のおもりにたらく浮力は、図 2 のおもりにたらく浮力より大きい。

[問題]

右図のように、同じ形で同じ体積の、材質が異なる物体 A、B を水そうの水の中に入れ、静かに手を離れたところ、物体 A は水に浮いて静止し、物体 B は水そうの底まで沈んで静止した。物体 A、B にはたらく重力の大きさをそれぞれ重力 A、重力 B とし、図の状態



図の状態

- ア 重力 A=浮力 A<浮力 B=重力 B
- イ 重力 A<浮力 A=浮力 B<重力 B
- ウ 重力 A=浮力 A<浮力 B<重力 B
- エ 重力 A<浮力 A<浮力 B<重力 B
- オ 重力 A=浮力 A=浮力 B<重力 B
- カ 重力 A<浮力 A<浮力 B=重力 B

(神奈川県)


[解答欄]

[解答]ウ

[解説]

物体 A にはたらく力は、重力 A と浮力 A の 2 つである。物体 A は静止しているの

で、重力 A=浮力 A である。…①  
 浮力の大きさは、物体の水



中にある部分の体積と同じ体積の水にはたらく重力の大きさと等しい(アルキメデスの原理)ので、水中にある部分の体積が大きい物体 B にはたらく浮力は、物体 A にはたらく浮力より大きい。浮力 A<浮力 B である。…②

物体 B にはたらく力は、重力 B と浮力 B と水そうの底面から上向きにはたらく垂直抗力の 3 つである。したがって、浮力 B+垂直抗力=重力 B である。


したがって、浮力 B<重力 B である。…③

①、②、③より、重力 A=浮力 A<浮力 B<重力 B となる。



[問題]

ばねの端に質量 30g の物体 A を、もう一方の端に質量 120g の物体 B をとりつけて、次の実験を行った。あとの問いに答えよ。ただし、ばねに加わる力とばねの伸びは比例するものとし、ばねの質量やばねにはたらく浮力は考えないものとする。また、質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。



(実験)

- ① 図 1 のように物体 A を手で持ち、物体 B をつるして静止させたところ、ばねののびは 6cm であった。
  - ② 次に、これらを静かに水の中に入れたところ、図 2 のように、物体 A は水面に浮かび、物体 B は沈んだ状態で静止した。このとき、ばねののびは 4cm であった。
- (1) 実験①のとき、物体 A に対して、手が上向きに加えている力の大きさは何 N か。
  - (2) 実験②のとき、物体 B にはたらく浮力の大きさは何 N か。
  - (3) 実験②のとき、物体 A にはたらく浮力の大きさは何 N か。

(和歌山県(旧))

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答](1) 1.5N (2) 0.4N (3) 1.1N

[解説]

(1) 物体 A と物体 B の質量の合計は  $30+120=150(\text{g})$  になる。質量 150g の物体にはたらく重力の大きさは、 $150\div 100=1.5(\text{N})$  である。

(2) 物体 B にはたらく重力の大きさは  $120\div 100=1.2(\text{N})$  である。したがって、図 1 のときにばねにはたらく力は 1.2N で、ばねは 6cm のびている。

よって、このばねを 1cm のばすのに必要な力は、 $1.2(\text{N})\div 6(\text{cm})=0.2(\text{N})$  である。

次に、図 2 のとき、ばねにはたらく力を求める。


ばねののびは 4cm なので、ばねにはたらく力は  $0.2(\text{N})\times 4=0.8(\text{N})$  である。

したがって、図 2 でばねが物体 B を引く力は 0.8N である。

図 2 の物体 B で、(ばねが B を引く力)+(B にはたらく浮力)=(B にはたらく重力)、よって、 $0.8+(\text{B にはたらく浮力})=1.2$

したがって、(B にはたらく浮力)= $1.2-0.8=0.4(\text{N})$  である。


(3) 次に、図 2 のときの物体 A にはたらく力について考える。



物体 A の質量は 30g なので、物体 A にはたらく重力は  $30 \div 100 = 0.3(\text{N})$  である。  
 (A にはたらく浮力) = (A にはたらく重力) + (ばねが A を引く力) なので、  
 (A にはたらく浮力) =  $0.3 + 0.8 = 1.1(\text{N})$  となる。

[問題]

水(密度  $1\text{g}/\text{cm}^3$ )をいっぱい満たした水そうに、物体 A を静かに入れたところ、水そうの水が  $50\text{cm}^3$  あふれて、ちょうど体積の半分が水中に入った状態で、図 1 のように浮いた。次に、物体 A に、物体 A と同じ体積の物体 B を細い糸でつりさげて、水そうの中に入れたところ、図 2 のように水中に静止した。次の問いに答えよ。ただし、糸の重さと体積は考えないものとする。また、質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。



- (1) 図 1 で物体 A にはたらく重力は何 N か。
- (2) 図 2 で物体 A にはたらく浮力は何 N か。
- (3) 図 2 で糸が A を引く力は何 N か。
- (4) 図 2 で物体 B にはたらく重力は何 N か。

(山梨県(旧))

[解答欄]


(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答](1) 0.5N (2) 1N (3) 0.5N (4) 1.5N

[解説]

(1) 「水をいっぱい満たした水そうに、物体 A を静かに入れたところ、水そうの水が  $50\text{cm}^3$  あふれた」ことから、物体 A の水面下の部分の体積は  $50\text{cm}^3$  であることがわかる。密度  $1\text{g}/\text{cm}^3$  の水  $50\text{cm}^3$  の質量は 50g である。水 50g にかかる重力の大きさは、 $50 \div 100 = 0.5\text{N}$  である。

よって、(浮力) = (物体がおしのけた体積分の水の重さ) =  $0.5(\text{N})$  である。  
 図 1 で、物体 A にかかる力は重力と浮力の 2 力で、この 2 つはつりあっているので、物体 A にはたらく重力は  $0.5\text{N}$  である。



(2) 図 1 のように、物体 A の下半分の体積は  $50\text{cm}^3$  であるので、物体 A の体積は  $50(\text{cm}^3) \times 2 = 100(\text{cm}^3)$  である。

図 2 では、物体 A はすべて水の中にあるので、その体積  $100\text{cm}^3$  分の水の重さが浮力の大きさになる。

水  $100\text{cm}^3$ の質量は  $100\text{g}$ なので、浮力の大きさは、 $100 \div 100 = 1(\text{N})$ になる。

(3)(4) 図 2 の物体 A, B にそれぞれはたらく力は右図のようになるが、これらの力の大きさをすべて求めることが必要である。まず、物体 A について、図より、

(A にはたらく重力)+(糸が A を引く力)=(A にはたらく浮力)が成り立つ。

(1)と(2)より、物体 A にはたらく重力は  $0.5\text{N}$ 、物体 A にはたらく浮力は  $1\text{N}$  であるので、

$$0.5 + (\text{糸が A を引く力}) = 1$$

$$\text{よって、} (\text{糸が A を引く力}) = 1 - 0.5 = 0.5(\text{N})$$


次に、物体 B について、図より、

(B にはたらく重力)=(B にはたらく浮力)+(糸が B を引く力)が成り立つ。

物体 B の体積は物体 A と同じなので、(B にはたらく浮力)=(A にはたらく浮力)= $1(\text{N})$


また、(糸が B を引く力)=(糸が A を引く力)= $0.5(\text{N})$

$$\text{よって、} (\text{B にはたらく重力}) = 1 + 0.5 = 1.5(\text{N})$$



[問題]

ばねばかりを手に持ち、これに滑車をつるして、滑車に通した糸の一端に底面積  $5\text{cm}^2$ 、高さ  $4\text{cm}$  で質量  $50\text{g}$  のガラス製円柱 A を取り付け、A を水のはいった水そうに入れた。糸の他端に A と同じ材質で質量  $36\text{g}$  の円柱 B を取り付けたところ、右図のように A の一部が水中に、B が空中にある状態でつりあって静止した。このとき、A、B の底面はともに水面に平行で A は水そうに触れていなかった。次の各問いに答えよ。ただし、糸の重さ及び滑車の摩擦は考えないものとする。また、質量  $100\text{g}$  の物体にはたらく重力の大きさを  $1\text{N}$  とする。



- (1) このとき、ばねばかりは何 N を示すか。ただし、滑車の質量は  $20\text{g}$  とする。
- (2) A の高さ  $4\text{cm}$  のうち、水中にはいつている部分の長さは何 cm か。
- (3) ばねばかりを持つ手を静かに下げていき、A の全体と B の一部が水中にはいつり、つりあった状態で静止させた。この状態で、A、B はいずれも水そうに触れていなかった。このとき、B が水から受ける浮力は何 N か。

(大阪府(旧))


[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答](1) 0.92N (2) 2.8cm (3) 0.06N

[解説]

(1) 滑車にはたらく力は、右図のように a~d の 4 力である。a は A が滑車を引く力、b は B が滑車を引く力、c は滑車にかかる重力、d はばねばかりが滑車を引く力である。



B の質量は 36g なので B にはたらく重力の大きさは、 $36 \div 100 = 0.36(\text{N})$  である。したがって、 $b = 0.36\text{N}$  である。

A と B は静止しているの、 $a = b$  である。よって、 $a = 0.36\text{N}$  である。

c は滑車にかかる重力である。滑車の質量は 20g なので、滑車にかかる重力の大きさは、 $20 \div 100 = 0.2(\text{N})$  になる。

a~d の 4 力はつりあっているの、 $d = a + b + c$  がなりたつ。

よって、 $d = 0.36 + 0.36 + 0.2 = 0.92(\text{N})$  となる。

(2) A にはたらく力は右図のようになる。

糸が A を引く力は(1)の a と同じ大きさの 0.36N である。

A の質量は 50g なので、A にはたらく重力の大きさは  $50 \div 100 = 0.5(\text{N})$  になる。A にはたらく 3 力はつりあっているの、

(糸が A を引く力) + (A にはたらく浮力) = (A にはたらく重力) が成り立つ。

よって、 $0.36 + (\text{A にはたらく浮力}) = 0.5$

したがって、 $(\text{A にはたらく浮力}) = 0.5 - 0.36 = 0.14(\text{N})$  である。

A にはたらく浮力が 0.14N なので、A の水中にある部分の水の質量は  $0.14 \times 100 = 14\text{g}$  で、その体積は  $14\text{cm}^3$  であることがわかる。

A の底面積は  $5\text{cm}^2$  なので、水中にはいつている部分の長さは、 $14(\text{cm}^3) \div 5(\text{cm}^2) = 2.8(\text{cm})$  である。

(3) A, B のそれぞれにはたらく力は右図のようになる。

まず、A について考える。

(2)より、 $(\text{A にはたらく重力}) = 0.5(\text{N})$  である。



また、A の体積は、 $5(\text{cm}^2) \times 4(\text{cm}) = 20(\text{cm}^3)$  で、A の全体が水の中にあるの、A にはたらく浮力の大きさは、水  $20\text{cm}^3$  にはたらく重力の大きさと等しくなる。水  $20\text{cm}^3$  は質量が 20g なので、重力の大きさは、 $20 \div 100 = 0.2(\text{N})$  になる。

したがって、 $(\text{A にはたらく浮力}) = 0.2\text{N}$  になる。

A にはたらく 3 力はつり合っているの、

(糸が A を引く力) + (A にはたらく浮力) = (A にはたらく重力)

よって、 $(\text{糸が A を引く力}) + 0.2 = 0.5$  ゆえに、 $(\text{糸が A を引く力}) = 0.5 - 0.2 = 0.3(\text{N})$



次に、Bについて考える。

$$(\text{糸が B を引く力}) = (\text{糸が A を引く力}) = 0.3(\text{N})$$

Bの質量は36gなので、(Bにはたらく重力) =  $36 \div 100 = 0.36(\text{N})$ である。

Bにはたらく3力はつり合っているので、

$$(\text{糸が B を引く力}) + (\text{Bにはたらく浮力}) = (\text{Bにはたらく重力})$$

$$\text{よって、} 0.3 + (\text{Bにはたらく浮力}) = 0.36$$

ゆえに、(Bにはたらく浮力) =  $0.36 - 0.3 = 0.06(\text{N})$ となる。

[問題]

図1は、ばねにつるしたおもりの質量と、そのばねの長さの関係を示したグラフである。図2~4は、このばねと定滑車を用いて、物体A、B、Cがそれぞれつりあっている状態を示している。AとBの質量は等しいが体積が異なり、AとCの体積は等しいが質量が異なる。





図3では、Aの体積の $\frac{2}{5}$ が水中にあり、Bは全体が水中

にある。図4では、Cは全体が水中にあり、Bは全体が空気中にある。ばねの長さは、図2、図4では32.0cmで、図3では28.0cmである。次の問いに答えよ。ただし、ばねやひもの質量および滑車の摩擦はないものとし、水の密度は $1.0\text{g}/\text{cm}^3$ とする。また、質量100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとする。



- (1) 図2において、物体Aをつるしているひもにはたらく力は何Nか。
- (2) 図3において、物体Bにはたらく浮力は何Nか。
- (3) 物体Aの体積は何 $\text{cm}^3$ か。
- (4) 物体Cの質量は何gか。

(福井県(旧))

[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答](1) 1.8N (2) 0.6N (3)  $150\text{cm}^3$  (4) 330g

【解説】

(1) グラフより、このばねは 300g で 20cm のびる。

したがって、1cm あたりでは、 $300 \div 20 = 15(\text{g})$ となる。

グラフよりばねのもとの長さは 20cm なので、図 2 の状態では、ばねは  $32 - 20 = 12(\text{cm})$  のびていることがわかる。よって、B の質量は、 $15 \times 12 = 180(\text{g})$ である。

(A の質量)=(B の質量)=180(g)であるので、

A にかかる重力の大きさは  $180 \div 100 = 1.8(\text{N})$ である。

よって、A がひもを引く力も 1.8N になる。

(2) B にはたらく 3 力は右図の通りである。

(1)より B の質量は 180g で、B にはたらく重力は 1.8N である。

ばねの長さは 28cm なので、ばねののびは  $28 - 20 = 8\text{cm}$  である。

(1)より、このばね 1cm 伸ばすのに必要な力は  $15 \div 100 = 0.15(\text{N})$ なので、ばねにはたらくしている力は  $0.15(\text{N}) \times 8 = 1.2(\text{N})$ である。

よって、(ひもが B を引く力)=1.2(N)である。

B にはたらく 3 力はつりあっているので、

(ひもが B を引く力)+(B にはたらく浮力)=(B にはたらく重力)

$1.2 + (\text{B にはたらく浮力}) = 1.8$

よって、(B にはたらく浮力)= $1.8 - 1.2 = 0.6(\text{N})$  であることがわかる。

(3) まず、A の体積を求めるために、A にはたらく浮力の大きさを求める。

A にはたらく 3 力はつりあっているので、

(ひもが A を引く力)+(A にはたらく浮力)=(A にはたらく重力) になりたつ。

(ひもが A を引く力)=(ひもが B を引く力)=1.2(N) である。

(1)より A の質量は 180g で、(A にはたらく重力)=1.8(N)である。

よって、 $1.2 + (\text{A にはたらく浮力}) = 1.8$

ゆえに、(A にはたらく浮力)= $1.8 - 1.2 = 0.6(\text{N})$  である。

$0.6\text{N}$ は  $0.6 \times 100 = 60(\text{g})$ の質量の水  $60\text{cm}^3$ にかかる重力の大きさに等しいので、

A の水面下にある部分の体積は  $60\text{cm}^3$ になる。

A の体積の  $\frac{2}{5}$  が水中にあるので、A の体積は、 $60(\text{cm}^3) \div \frac{2}{5} = 60(\text{cm}^3) \times \frac{5}{2} = 150(\text{cm}^3)$  であ


ることがわかる。

(3) C にはたらく 3 力は右図の通りである。

図 4 の状態では、ばねは  $32 - 20 = 12(\text{cm})$ のびているので、

ひもがばねを引く力は、 $0.15(\text{N}) \times 12 = 1.8(\text{N})$ である。

したがって、(ひもが C を引く力)=1.8(N)になる。



Cの体積はAと同じ  $150\text{cm}^3$ である。水  $150\text{cm}^3$ は  $150\text{g}$ で、水にかかる重力の大きさは、 $150 \div 100 = 1.5(\text{N})$ である。


したがって、(Cにかかる浮力) =  $1.5(\text{N})$ である。

Cにはたらく3力はつりあっているので、

(Cにはたらく重力) = (ひもがCを引く力) + (Cにかかる浮力) となり  
たつ。

よって、(Cにはたらく重力) =  $1.8 + 1.5 = 3.3(\text{N})$  となる。

したがって、Cの質量は、 $3.3 \times 100 = 330(\text{g})$  であることがわかる。




## 【】 大気圧

### [大気圧の実験]

#### [問題]

右図のように、少量の水を入れた空き缶をガスバーナーで加熱し、中の水をしばらく沸騰させた。そのあと、ラップシートで缶の口の部分をふさいで、水をかけて急冷すると、缶がつぶれた。次の文は、缶がつぶれた理由を説明したものである。文中の①～③に適切な語句を入れよ。



空気を含めて、地球上のすべてのものには( ① )とよばれる力がはたらいており、缶から上空まで厚い空気の層の重さによって、大気圧が生じている。大気圧は缶に対してあらゆる向きに同じようにはたらいている。加熱した缶の口の部分をラップシートでふさいで急冷すると、缶の中の水蒸気が( ② )に変化して、中の圧力が大気圧に比べて( ③ )なるので、缶がつぶれる。

(宮城県)


#### [解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① 重力 ② 水 ③ 小さく

#### [解説]


地表面の上には、大気とよばれる厚い空気の層がある。空気の密度は固体や液体に比べると非常に小さいが、上空までの空気の厚さを考えると、厚い空気の層の重さはかなり重く、 $1\text{cm}^2$ あたりに約  $1\text{kg}$ の重さ( $10\text{N}$ )の力がかかっている。これは  $1\text{m}^2$ あたりでは  $10000\text{kg}=10\text{t}$ の重さになる。この大気圧は全ての方向からかかっているが、例えば缶の表面積を  $0.3\text{m}^2$  とすると、缶全体には  $3\text{t}$ の大気圧による力が加わっていることになる。空き缶をそのまま置いたときは、缶がつぶれることはないが、これは缶の内部の大気圧も同じなので、外側と内側で同じ大きさの力が加わるためである。しかし、この実験のように、空き缶に水を入れて加熱すると発生した水蒸気によって中の空気が押し出される。加熱した缶の口の部分をラップシートでふさいで急冷すると、缶の中の水蒸気が水に状態変化し、缶内部の気体(水蒸気)がほとんどなくなり、缶内部の気圧が非常に小さくなってしまふ。その結果、缶の内部から缶をおす力は、外部から大気圧がおす力より小さくなってしまふ、缶はつぶれてしまふ。





[問題]

右図のように、ペットボトルに熱いお湯を入れ口から湯気が出るのを確認してから、お湯を全部捨て、すぐにキャップをしっかりと閉めた。しばらくすると、ペットボトルはつぶれてしまった。次の( )に適語を入れ、この現象を説明した文を完成せよ。



ペットボトル内の水蒸気が冷え、状態変化して( ① )に変わり、ペットボトル内の圧力が( ② )なり、( ③ )によっておしつぶされた。

(長崎県)

[解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① 水 ② 小さく ③ 大気圧

[問題]

右図のような実験を行い、大気圧について考えた。

[実験]


次の(a)~(d)の手順で実験を行った。

(a) 2つのコップと穴を開け水でぬらしたろ紙を用意し、ろ紙をはさんで上からコップをかぶせ、この状態で全体の質量をはかった。

(b) 下のコップに火のついたマッチ棒を入れた。

(c) マッチ棒が半分ほど燃えたときに、ろ紙をはさんで上からコップを押しつけてしばらく時間をおき、冷ました。

(d) 上のコップを持ち上げると2つのコップはくっついたまま持ち上がった。くっついた状態で全体の質量をはかった。



この実験において、手順(a)と(d)ではかった質量を比較すると、マッチ棒が入っているにもかかわらず、(d)ではかった質量の方が小さかった。

(1) 手順(a)と(d)で質量が異なっていたのはなぜか。その理由を述べた次の文の( )内を適切なことばで埋めよ。

マッチの熱により①( )が膨張し、その一部が②( )ため。

(2) 実験 2 について説明した次の文の①, ②に入ることばをそれぞれ( )内から選べ。  
 手順(c)の後, 2つのコップ内部の気圧が大気圧と比べて①(小さく/大きく)なり, 2  
 つのコップにはたらく圧力は, ②(外側より内側/内側より外側)の方が大きくなる  
 ので, 2つのコップはくっついてはなれなかった。

(兵庫県)

[解答欄]

(1)①	②	(2)①
②		

[解答](1)① コップ内の空気 ② 外へ逃げた (2)① 小さく ② 内側より外側

[大気圧]

[問題]

登山の途中, 気圧を測定したところ, 標高 1500mでは 846hPa, 2000mでは 795hPa  
 であった。標高 1500mと 2000mの地点で, 1m<sup>2</sup>の水平面上にある空気の質量の差は何  
 kgか。ただし, 100gの物体にはたらく重力を 1Nとする。また, 1hPaは 100Paである。

(石川県)

[解答欄]

[解答]510kg

[解説]

標高 1500m では 846hPa=84600 Pa

標高 2000m では 795hPa=79500 Pa

なので, 気圧の差は  $84600 - 79500 = 5100$ (Pa)となる。1Nは  $100g = 0.1kg$ の物体にはた  
 らく重力の大きさなので, 1m<sup>2</sup>の水平面上にある空気の質量の差は,

$5100 \times 0.1 = 510kg$  となる。

[問題]

教室の大気圧が 100000Pa のとき、縦 1m、横 0.5m の窓ガラスの教室側の面に大気からはたらく力の大きさは何 N か。

(岐阜県)

[解答欄]


[解答]50000N

[解説]

(力の大きさN)=(大気圧Pa)×(面積m<sup>2</sup>)=100000(Pa)×0.5(m<sup>2</sup>)=50000(N)

[問題]

右の図のように、注射器の中に発泡ポリスチレンの立方体を入れ、注射器を押して圧力を加えると、注射器の中の空気の圧力は、(1つの向き／あらゆる向き)に伝わり、発泡ポリスチレンの立方体の体積は小さくなる。



(福島県)

[解答欄]

[解答]あらゆる向き

[問題]

空気にも重さがあるので、地上にある物体は、その上空にある空気の重さによって圧力を受けている。この圧力を大気圧というが、大気圧のはたらく向きについて述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

ア 水平な向きにのみはたらく。

イ 上向きにのみはたらく。

ウ 下向きにのみはたらく。

エ あらゆる向きにはたらく。

(東京都)

[解答欄]

[解答]エ

[問題]

大気圧と関係が深いものを次のア～カから2つ選び、その符号を書け。

- ア 窓ガラスにつけた吸盤が落ちてこない。
- イ 湯の中に入れたドライアイスから白い煙が出る。
- ウ 水が冷凍庫で氷になり、体積が増える。
- エ スポイトを使って水を吸い上げる。
- オ 寒い冬の朝、口からはいた息が白くくもる。
- カ 自転車で坂道を下るとき、ペダルを踏まなくても次第に速くなる。

(石川県)

[解答欄]

[解答]ア, エ

[印刷/他のPDFファイルについて]

※ このファイルは、FdData 入試理科(16,200 円)の一部を PDF 形式に変換したサンプルで、印刷はできないようになっています。製品版の FdData 入試理科は Word の文書ファイルで、印刷・編集を自由に行うことができます。

※FdData入試理科・入試社会全分野のPDFファイル, FdData中間期末(社会・理科・数学)全分野のPDFファイル, および製品版の購入方法は<http://www.fdtex.com/dan/> に掲載しております。

下図のような, [FdData 無料閲覧ソフト(RunFdData2)]を, Windows のデスクトップ上にインストールすれば, FdData 中間期末・FdData 入試の全 PDF ファイル(各教科約 1800 ページ以上)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインストールが開始されます。

RunFdData 【 <http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataWDs.exe> 】

※ダイアログが表示されたら, 【実行】ボタンを左クリックしてください。インストール中, いくつかの警告が出ますが, [実行][許可する][次へ]等を選択します。

【イメージ画像】



【Fd教材開発 : URL <http://www.fdtex.com/dat/> Tel (092) 404-2266】